

INSTRUKCJA POBRANIA

PORANNY MOCZ ZE STABILIZATOREM



WAŻNE

W przypadku pobierania różnych próbek materiału biologicznego krew pobierana jest zawsze jako ostatnia

Materiał do pobrania próbki

Do zbiórki moczu należy użyć:

- 1 czysty pojemnik zbiorczy (należy przygotować samodzielnie)
- 1 pojemnik z żółtą nakrętką



WAŻNE

Pojemnika nie wolno płukać.

Zawiera stabilizator niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia analizy.

Próbkę należy pobrać na czczo.

Dotyczy badań PBB dysbioza i grzybica jelit, PBB grzybica jelit oraz PBB kandydoza.

W przeddzień zbiórki:

- ⚠ Spożywaj zróżnicowane posiłki z węglowodanami, tłuszczami i białkami.
- ⚠ Unikaj wina, winogron, jabłek i gruszek.

PRZED WYKONANIEM POBRANIA:

Prosimy o konsultację z lekarzem w celu ustalenia, czy aktualnie stosowane leczenie (leki, suplementy diety itp.) powinno zostać czasowo wstrzymane.



KROK 1

Wpisz **kod pacjenta, datę urodzenia, datę oraz godzinę pobrania materiału** na etykiecie dostarczonego pojemnika.



KROK 2

Dokładnie umyj ręce.



KROK 3

Zbierz **pierwszy poranny mocz** do przygotowanego wcześniej czystego pojemnika. Jeśli musisz oddać mocz w nocy, zastąpi on pierwszy poranny mocz.



KROK 4

Otwórz pojemnik i przelej do niego zebrany mocz. Otwórz pojemnik z żółtą zakrętką i przelej do niego zebrany mocz.

Upewnij się, że pojemnik jest dobrze napełniony.



KROK 5

Zamknij szczelnie pojemnik i umieść go w dołączonym woreczku transportowym.